

寒波に伴う農作物の事前・事後対策技術について（12月）

1. 甘しょ

1) 寒害（霜害）技術対策

- (1) 種いも貯蔵中に低温に遭遇すると腐敗することがあるので、屋外貯蔵の場合はイモガマに積雪したときは早急に除雪するとともに、イモガマに冷水が入らないように注意する。
- (2) 貯蔵温度が10℃以下に低下するような場合は、ワラ囲い等を行い保温に努める。

2. ばれいしょ

1) 寒害技術対策

冬作、春作ばれいしょの植え付け、マルチ張り作業はその地域での寒害発生時期を回避できる時期に行う。

3. 野菜

1) 寒害（霜害）技術対策

〔共通〕

- (1) ハウス、トンネル栽培の場合は、ビニール等の破損や隙間風がないか、ハウス栽培では、暖房機や二重カーテンなどによる保温が十分できているか点検しておく。
- (2) ビニール、べたかけ資材被覆、マルチング等により地温の上昇を図る。
- (3) 生育初期における窒素質肥料の多施用を避ける等、健全な生育管理に努める。
- (4) 早まき、早植えを極力避ける。
- (5) 積雪による被害を受けやすい地域では、施設の破損、倒壊を防止するため、施設の点検に努め、必要に応じて補強、破損か所の補修を行う。
- (6) 積雪時には、栽培施設内の温度を高め、積雪の落下を促進する。また、速やかに除雪を行う。
- (7) 被害が発生した場合には、欠株の補植、速効性肥料の施用等適切な肥培管理により、草勢の回復を図るとともに、病害虫の防除を徹底する。

4. 果樹

1) 寒害（霜害）技術対策

- (1) ハウスびわでは、保温対策に努める。
- (2) ハウスに積雪した場合は、内張りカーテンを巻き上げ屋根の雪を溶かす。また、必要に応じて除雪も行う。除雪作業は危険を伴うので十分注意する。

5. 花き

1) 寒害（霜害）技術対策

〔共通〕

- (1) ハウス栽培の場合は、ビニール等の破損や隙間風がないか、暖房機や二重カーテンなどによる保温が十分できているか点検しておく。
- (2) 低温により開花遅延が懸念される品目（キクなど）については、暖房機等を利用し、適切な温度管理に努める。
- (3) 生育初期における窒素質肥料の多施用を避ける等、健全な生育管理に努める。
- (4) 積雪による被害を受けやすい地域では、施設の破損、倒壊を防止するため、施設の点検に努め、必要に応じて補強、破損箇所の補修を行う。

- (5) 積雪時には、栽培施設内の温度を高め、積雪の落下を促進する。また、速やかに除雪を行う。
- (6) 被害が発生した場合には、欠株の補植、速効性肥料の施用等適切な肥培管理により、草勢の回復を図るとともに、病虫害の防除を徹底する。

6. 茶

1) 寒害（霜害）技術対策

- (1) 茶葉の硬化を確認し機械油乳剤を散布する。季節風の強い所では、茶株面の直接被覆と組合せる。（機械油乳剤は赤焼病を助長するので常発園では使用を控える。）
- (2) 寒干害（青枯れ）に対しては、敷草などを事前に行って土壌の乾燥や地温の低下を防ぐ。
- (3) 防風ネットなどを整備する。幼木園では防風作物のソルゴーを刈り揃え、立ち枯れ状態でうね間に残したりする。
- (4) 寒害が軽微の場合はそのまましておく。
赤焼病の発生がある場合は、初期にカスガマイシン・銅水和剤で防除する。
被害が中程度で青枯、赤枯の茎葉が1番葉に混入するようであれば春整枝時期に摘採面を揃える程度に軽くせん枝する。
被害が甚だしく、枝枯、落葉している場合は、2月下旬～3月上旬に健全部位までせん枝するか、一番茶芽の生育を確認し（5月下旬）に深刈り、中切りなどの更新を行う。

7. 畜産

1) 寒害技術対策

〔家畜飼養管理対策〕

- (1) 給水施設の凍結を防止する。また朝・晩に凍結確認・点検を行う。
（例）・パイプを断熱資材（発泡スチロールなど）で包む。
塩化ビニールパイプは、「黒色ポリパイプ」に取り替える。
- (2) 畜舎のすきま風を防ぎ保温に努めるが、換気に留意する。
また日光が当たる側は可能であれば、側壁、屋根の一部を日光が入る透明の「ポリカーボネート波板」に替えることも有効。
- (3) 敷料は多めに行い、湿った敷料は早めに搬出する。
- (4) 特に3カ月令までの子牛は敷料を多くし、子牛房の一部に電熱球（豚用コルツヒーター、投光器など）を下げて保温や保温箱の作成設置など保温対策を組み合わせる。なお、設置の際は火災など安全面には十分留意する。
- (5) 子牛の防寒、下痢予防に手作りベストや保温ジャケット、オーバー（市販品もある）の使用も有効。
- (6) 母牛は「昼間分娩法」（朝6時から夜9時までに8割を分娩させる方法）を行い、深夜・夜明け分娩による事故を防止する。
「昼間分娩法」とは分娩2週間前から分娩するまで、1日分のエサを夕方1回のみ給与する。給水は自由、朝にエサが残っている場合は取り除く。

〔飼料対策〕

- (1) 寒害時の刈り取りは避け、生育が回復してから行う。
- (2) 発芽が悪い時は、早めに追播又は播き直しを行う。

(例) ・発芽不良や春の飼料不足のため、12月以降に播種する場合は、極早生えん麦を2月下旬に播種量10kgで散播すると5月下旬から6月上旬に収穫できる。

- (3) 生育が悪いときは、暖かくなってから追肥を行う。
- (4) 寒害に強い草種（イタリアンライグラス等）を選択する。
- (5) 粗飼料の不足に備えて、稲わらや、その他貯蔵飼料を十分確保しておく。